4.2 ДУ первого порядка (ДУ₁)

Nota. Среди ДУ₁ рассмотрим несколько типов точно интегрируемых ДУ

- 1) Уравнение с разделяющимися переменными (УРП)
- 2) Однородное уравнение (ОУ)
- 3) Уравнение полных дифференциалов (УПД)
- 4) Линейное дифференциальное уравнение первого порядка (ЛДУ₁)

Кроме этого интегрируются дифференциальные уравнения Бернулли, Лагранжа, Клеро, Рикатти и др. (см. литературу)

1* УРП

Решение : $N(y)M(x) \neq 0$ $\frac{m(x)}{M(x)}dx + \frac{n(y)}{N(y)}dy = 0$ y = y(x) - неизвестная функция (ее ищем, решая ДУ) $\left(\frac{m(x)}{M(x)} + \frac{n(y)}{N(y)}y'\right)dx = 0$ Интегрируем по dx:

$$\int \left(\frac{m(x)}{M(x)} + \frac{n(y)}{N(y)}y'\right)dx = const$$

По свойствам интеграла:

Def. m(x)N(y)dx + M(x)n(y)dy = 0

$$\int \frac{m(x)}{M(x)} dx + \int \frac{n(y)}{N(y)} dy = const$$
 или:
$$\int \frac{m(x)}{M(x)} dx = \int \frac{-n(y)}{N(y)} dy$$

Ex. xdy - ydx = 0

$$xdy = ydx$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x} \quad (x, y \neq 0)$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = \ln|x| + \tilde{C} = \ln|\tilde{\tilde{C}}x|$$

$$|y| = |\tilde{\tilde{C}}x|$$

$$y = Cx, \quad C \in \mathbb{R}$$

Заметим, x = y = 0 - решение, но они учтены общим решением y = Cx, (при C = 0, y = 0) и подстановкой в ДУ x = 0

Nota. В процессе решения нужно проверить M(x) = 0 и N(y) = 0

$$M(x)=0$$
 при $x=a$ и $N(y)=0$ при $y=b$

$$m(a)\underline{N(b)}dx + n(b)\underline{M(a)}dy = 0$$

To есть
$$M(x) = 0$$
 и $N(y) = 0$ - решение

2* OY

Def. 1. Однородная функция n-ого порядка называется функция f(x,y) такая, что $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^k f(x, y), \quad \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0$

$$Ex.\ f=\cos\left(\frac{x}{y}\right),\cos\left(\frac{\lambda x}{\lambda y}\right)=\cos\left(\frac{x}{y}\right)$$
 - нулевой порядок однородности $f=\sqrt{x^2+y^2}$ - первый порядок

Def. 2. P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0, где P(x,y), Q(x,y) - однородные функции одного порядка -OY

Решение
$$P(x, y) = P\left(x \cdot 1, x \cdot \frac{y}{x}\right) = x^k P\left(1, \frac{y}{x}\right)$$

$$Q(x,y) = x^k Q\left(1, \frac{y}{x}\right)$$

Тогда,
$$P\left(1, \frac{y}{x}\right) dx + Q\left(1, \frac{y}{x}\right) dy = 0.$$

Обозначим
$$\frac{y}{x} = t$$
, $y' = \frac{dy}{dx} \stackrel{y=tx}{==} t'_x x + t x'_x = t'_x x + t$
 $P(1,t) + Q(1,t)y' = P(1,t) + Q(1,t)(t'x+t) = 0$

$$P(1,t) + Q(1,t)y' = P(1,t) + Q(1,t)(t'x+t) = 0$$

$$P(1,t) + Q(1,t)y = P(1,t) + t'x + t = -\frac{P(1,t)}{Q(1,t)} \stackrel{\text{обозн}}{=} f(t)$$
 $t'x = f(t) - t$

$$t'x = f(t) - t$$

$$\frac{dt}{dx}x = f(t) - t \neq 0$$

$$\frac{dt}{f(t) - t} = \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{dt}{f(t) - t} = \int \frac{dx}{x} = \ln|Cx|$$

$$Cx = e^{\int \frac{dt}{f(t)-t}} = \varphi(x,y)$$
 - общий интеграл

Если f(t)-t=0, то пусть t=k - корень, тогда $k=\frac{y}{x} \to y=kx$ - тоже решение

Ex.
$$(x+y)dx + (x-y)dy = 0$$

 $\frac{y}{x} = t$ $y' = t'x + t$
 $y = tx$ $dy = (t'x+t)dx$
 $(x+tx)dx + (x-tx)(t'x+t)dx = 0$
 $(1+t) + (1-t)(t'x+t) = 0$

$$t'(1-t)x+t-t^2+1+t=0$$

$$t'(1-t)x=t^2-2t-1$$

$$\frac{(1-t)dx}{t^2-2t-1}=\frac{dx}{x}-\mathrm{УРП}$$

$$\frac{(1-t)dt}{(1-t)^2-2}=-\frac{1}{2}\frac{d((1-t)^2)-2}{(1-t)^2-2}=-\frac{1}{2}\ln|(1-t)^2-2|=\ln\frac{1}{\sqrt{(1-t)^2-2}}=\ln|Cx|$$

$$\tilde{C}x=\frac{1}{\sqrt{(1-t)^2-2}}\Longleftrightarrow Cx^2=\frac{1}{(1-t)^2-2}=\Longleftrightarrow Cx^2((1-t)^2-2)=1$$

$$C((y-x)^2-2x^2)=1$$

$$C(y^2-2xy-x^2)=1$$

$$y^2-2xy-x^2=C$$
 - гиперболы
$$(t-1)^2-2=0$$

$$\frac{y}{x}=1\pm\sqrt{2}$$

$$y=(1\pm\sqrt{2})x$$
 - асимптоты

3* Уравнение в полных дифференциалах

Def.
$$P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$$
 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ - УПД

$$Ex. \ (x+y)dx + (x-y)dy = 0 \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

$$\Phi(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} (x+y)dx + (x-y)dy = \int_{(0,0)}^{(x,0)} xdx + \int_{(x,0)}^{(x,y)} (x-y)dy = \frac{x^2}{2} \Big|_{(0,0)}^{(x,0)} + (xy + \frac{y^2}{2}) \Big|_{(x,0)}^{(x,y)} = \frac{x^2}{2} + xy - \frac{y^2}{2} + C$$
 - общий интеграл
$$x^2 + 2xy - y^2 = C$$

4* ЛДУ

Def.
$$y' + p(x)y = q(x)$$
 - ЛДУ₁ $p, q \in C_{[a,b]}$

Nota. Будем решать методом Лагранжа (метод вариации произвольной постоянной) Принцип: если удалось найти частное решение ДУ $_{\text{однор}}$ (обозначим y_0), то общее решение ДУ $_{\text{неод}}$ можно искать в виде $y = C(x)y_0$

Def. Однородное (ЛОДУ): y' + p(x)y = 0

Def. Неоднородное (ЛНДУ): y' + p(x)y = q(x)

$$Ex. \ \exists y(x) = x^2 e^{-x}$$
 - частное решение ЛНДУ

А
$$y_0 = xe^{-x}$$
, тогда $y = xxe^{-x} = C(x)xe^{-x}$

То есть C(x) варьируется, чтобы получить решение y = y(x)

Решение a)
$$y' + p(x)y = 0$$

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 - \text{VP}\Pi$$

$$\frac{dy}{y} = -p(x)dx$$

$$\ln |\tilde{C}y| = -\int p(x)dx$$

$$\overline{y} = Ce^{-\int p(x)dx} = Cy_0$$

б)
$$y' + p(x)y = q(x)$$

Ищем y(x) в виде $y = C(x)y_0$

$$C'(x)y_0 + C(x)y'_0 + p(x)C(x)y_0 = q(x)$$

$$C'(x)y_0 + C(x)\underbrace{(y'_0 + p(x)y_0)}_{=0} = q(x)$$

$$C'(x) = \frac{q(x)}{y_0} = q(x)e^{\int p(x)dx}$$

$$C(x) = \int_{0}^{\infty} q(x)e^{\int p(x)dx}dx$$