

Классификация точек покоя. Будем рассматривать СДУ (автономную)

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax + by \\ \frac{dy}{dt} = kx + my \end{cases} \quad \dot{X} = AX \implies \det(A - \lambda E) = 0$$

Далее все зависит от  $\lambda_{1,2}$

Заметим, что функции  $x = 0$  и  $y = 0$  являются решениями (подстановка)

Причем, точка  $(0, 0)$  - особая, так как СДУ  $\rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{kx + my}{ax + by}$

Рассмотрим различные случаи значений  $\lambda_{1,2}$ :

1)  $\lambda_1 \neq \lambda_2, \lambda_{1,2} \in \mathbb{R}^-$

Тогда решения СДУ будут  $x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$ ,  $\dot{x}(t) = C_1 \lambda_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 \lambda_2 e^{\lambda_2 t}$

Подставляем в первое уравнение, из него получаем  $y(t) = \frac{1}{b}(C_1(\lambda_1 - a)e^{\lambda_1 t} + C_2(\lambda_2 - a)e^{\lambda_2 t})$

Введем Н.У.  $y(0) = y_0, x(0) = x_0$

Решение З.К.: 
$$\begin{cases} x(t) = \frac{ax_0 + by_0 - x_0 \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} e^{\lambda_1 t} + \frac{x_0 \lambda_1 - ax_0 - by_0}{\lambda_1 - \lambda_2} e^{\lambda_2 t} \\ y(t) = \frac{1}{b} \left( \frac{ax_0 + by_0 - x_0 \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} (\lambda_1 - a) e^{\lambda_1 t} + \frac{x_0 \lambda_1 - ax_0 - by_0}{\lambda_1 - \lambda_2} (\lambda_2 - a) e^{\lambda_2 t} \right) \end{cases}$$

При  $t \rightarrow +\infty$   $|e^{\lambda_i t}| < 1$  и  $\forall \varepsilon > 0$  
$$\begin{cases} |\tilde{x}_0 - x_0| < \delta \\ |\tilde{y}_0 - y_0| < \delta \end{cases} \implies \begin{cases} |\tilde{x}(t) - x(t)| < \varepsilon \\ |\tilde{y}(t) - y(t)| < \varepsilon \end{cases}$$

$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0, \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 0$ , то есть  $(0, 0)$  - устойчивое решение

Ex. 1. 
$$\begin{cases} \dot{x} = -x \\ \dot{y} = -2y \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{dx}{x} = -dt \\ \frac{dy}{y} = -2dt \end{cases} \iff \begin{cases} x = C_1 e^{-t} \\ y = C_2 e^{-2t} \end{cases} + \text{Н.У.} \implies \begin{cases} x = x_0 e^{-t} \\ y = y_0 e^{-2t} \end{cases}$$

Изобразим интегральные кривые (фазовый портрет системы): СДУ  $\implies \frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x} \implies y = Cx^2$

В этом примере получается семейство парабол, при  $t \rightarrow +\infty$  они все стремятся к  $(0, 0)$  - устойчивому узлу

2)  $\lambda_1 \cdot \lambda_2 < 0, \lambda_{1,2} \in \mathbb{R}$

Ex. 2. 
$$\begin{cases} \dot{x} = x \\ \dot{y} = -2y \end{cases} \implies \begin{cases} x = x_0 e^t \\ y = y_0 e^{-2t} \end{cases}$$

Фазовый портрет  $\frac{dy}{dx} = \frac{-2y}{x} \implies y = \frac{C}{x^2}$

Гиперболы при  $t \rightarrow \infty$  стремятся к точками  $(\pm\infty, 0)$  и образуют так называемое седло неустойчивости

3)  $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta, \alpha < 0$

Ex. 3. 
$$\begin{cases} \dot{x} = -x + y \\ \dot{y} = -x - y \end{cases} \quad \lambda_{1,2} = -1 \pm i$$

$$\begin{cases} x(t) = e^{-t}(x_0 \cos t + y_0 \sin t) \\ y(t) = e^{-t}(y_0 \cos t - x_0 \sin t) \end{cases} \quad \text{- устойчивая}$$

Фазовый портрет: перейдем в ПСК 
$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi & x_0 &= A \cos \varphi_0 \\ y &= \rho \sin \varphi & y_0 &= A \sin \varphi_0 \end{aligned}$$

Тогда 
$$\begin{cases} \rho \cos \varphi = e^{-t} = A \cos(t - \varphi_0) \\ \rho \sin \varphi = e^{-t} = A \sin(t - \varphi_0) \end{cases} \implies \rho^2 = A^2 e^{-2t} \implies \rho = A e^{-t}$$

Выразим  $t$  через  $\varphi$ :  $\tan \varphi = \tan(t - \varphi_0)$

Получаем  $\rho = Ae^{-(\varphi + \varphi_0 + \pi n)}$

Получается семейство логарифмических спиралей ( $\rho = Ae^\varphi$ )

3')  $\lambda_{1,2} = \pm i\beta (\alpha = 0)$

$$\begin{cases} x(t) = x_0 \cos \beta t + y_0 \sin \beta t \\ y(t) = y_0 \cos \beta t - x_0 \sin \beta t \end{cases}$$

Фазовый портрет - семейство соосных и концентрических эллипсов. Центр этих эллипсов

устойчивый

4)  $\lambda_{1,2} \in \mathbb{R}, \lambda_1 \cdot \lambda_2 = 0$

Lab.

1.  $\begin{cases} \dot{x} = 0 \\ \dot{y} = -y \end{cases}$

2.  $\begin{cases} \dot{x} = -x \\ \dot{y} = -y \end{cases}$

3.  $\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x \end{cases}$

Обобщим. Если хотя бы один  $\lambda \neq 0$  и лежит слева от  $Im\lambda$ , то решение устойчивое